

## CONSUMO DE TABACO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Encuesta Anual de Hogares del año 2006 incorpora la indagación sobre el consumo de tabaco en la población porteña.

A continuación se presentan algunos resultados que dan cuenta de la incidencia del consumo de tabaco según otros atributos relevantes de la población y que permiten caracterizar a los fumadores y a los hogares que éstos habitan.

En primer lugar, la **proporción de fumadores** en la población mayor de 14 años<sup>1</sup> de la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 21,7%.

**Cuadro 1** Distribución porcentual de la población mayor de 14 años por consumo de tabaco. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fumadores	21,7
No fumadores	78,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

Los resultados por **Comuna**<sup>2</sup> muestran diferencias que en general son de escasa relevancia: si se comparan las Comunas que poseen el mayor y el menor porcentaje de fumadores (Comunas 1 y 12, respectivamente) se observa que la brecha entre ambas es de 3,8 puntos porcentuales.

La población de las Comunas 1, 13 y 14 registra los niveles más altos de presencia de fumadores (23% y más); en tanto que en las Comunas 5, 8, 10 y 12 se alcanza la proporción más baja. En ellas, alrededor del 20% de las personas fuman.

<sup>1</sup> Se considera el grupo de 14 años y más ya que la incidencia de fumadores en la población menor de 14 años es insignificante.

<sup>2</sup> **Comuna 1:** comprende los barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo, Constitución, Puerto Madero; **Comuna 2:** comprende el barrio Recoleta; **Comuna 3:** comprende los barrios Balvanera, San Cristóbal; **Comuna 4:** comprende los barrios Parque Patricios, Barracas, La Boca, Nueva Pompeya; **Comuna 5:** comprende los barrios Almagro, Boedo; **Comuna 6:** comprende el barrio Caballito; **Comuna 7:** comprende los barrios Flores, Parque Chacabuco; **Comuna 8:** comprende los barrios Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo; **Comuna 9:** comprende los barrios Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda; **Comuna 10:** comprende los barrios Villa Real, Monte Castro, Versalles, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta; **Comuna 11:** comprende los barrios Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre; **Comuna 12:** comprende los barrios Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan; **Comuna 13:** comprende los barrios Nuñez, Belgrano, Colegiales; **Comuna 14:** comprende el barrio Palermo; **Comuna 15:** comprende los barrios Agronomía, Villa Ortúzar, Chacarita, La Paternal, Villa Crespo, Parque Chas.

**Cuadro 2** Porcentaje de fumadores en la población de mayor de 14 años según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna	% de fumadores
1	23,9
2	22,5
3	21,3
4	20,9
5	20,2
6	20,8
7	21,5
8	20,2
9	22,3
10	20,4
11	21,8
12	20,1
13	23,6
14	23,0
15	22,6
<b>Ciudad de Bs. As.</b>	<b>21,7</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

Al comparar los resultados por **grupos de edad**, las diferencias se tornan significativas. La proporción de fumadores es relativamente baja en las edades extremas y alta en las intermedias. En efecto, el porcentaje de fumadores pasa de 10,8% entre los más jóvenes a casi triplicarse (26,7%) entre las personas de 20 a 29 años. Si bien en el grupo siguiente (30 a 39 años) desciende 3 puntos, el porcentaje de fumadores vuelve a aumentar en los siguientes grupos de edad, alcanza un pico de 30% en el grupo de 50 a 59 años y luego desciende abruptamente al 11% entre las personas de 60 años y más.

**Cuadro 3** Porcentaje de fumadores en la población de 14 años y más según grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Edad	% de fumadores
15 a 19 años	10,8
20 a 29 años	26,7
30 a 39 años	23,4
40 a 49 años	29,5
50 a 59 años	30,0
60 y más años	11,0
<b>Total</b>	<b>21,7</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

El diferencial que introduce el **sexo** muestra que la proporción de varones fumadores supera al de las mujeres en casi 4 puntos porcentuales (23,9 frente a 20,0%).

**Cuadro 4** Porcentaje de fumadores en la población mayor de 14 años según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Sexo	% de fumadores
Varones	23,9
Mujeres	20,0
<b>Total</b>	<b>21,7</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

Ahora bien, la brecha por sexo varía según el grupo de edad de manera que merece ser analizada. Es más pequeña en las edades más tempranas (entre los 15 y los 29 años ronda los 2 puntos), lo que supone un comportamiento más homogéneo por sexo en esas edades; se incrementa notablemente en los grupos intermedios (entre los 30 y los 49 años supera los 5 puntos) y entre los 50 y los 59 años se invierte: las mujeres resultan proporcionalmente más fumadoras que los varones, y con una diferencia relativamente marcada: casi tres puntos porcentuales. Finalmente, en el grupo de 60 años y más la brecha vuelve a ser la misma que para el total poblacional. Así, desde el punto de vista del sexo y la edad, el grupo con mayor incidencia de consumo de tabaco es el de los varones de edades intermedias (40 a 49 años), seguido por el de las mujeres de 50 a 59 (32,4% y 31,3%, respectivamente).

**Cuadro 5** Porcentaje de varones y mujeres fumadores en la población mayor de 14 años y diferencia porcentual según grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Grupos de edad	Varones	Mujeres	Diferencia Varones - Mujeres
15 a 19 años	11,8	10,0	1,9
20 a 29 años	27,8	25,7	2,1
30 a 39 años	26,3	20,7	5,6
40 a 49 años	32,4	27,2	5,1
50 a 59 años	28,5	31,3	-2,9
60 y más años	13,4	9,5	3,9
<b>Total</b>	<b>23,9</b>	<b>20,0</b>	<b>3,9</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

Resulta pertinente, por otra parte, reparar en la relación entre consumo de tabaco y **nivel de ingreso**. Si se ordena a la población de 14 y más años en tres grupos según el ingreso del hogar<sup>3</sup>, se observa que la proporción de fumadores crece conforme aumenta el nivel de ingreso. La diferencia en el porcentaje de fumadores entre los grupos bajo y medio es de más de 3 puntos porcentuales y entre grupos extremos, asciende a 5 puntos.

<sup>3</sup> Para armar los grupos ingreso, se ordenó a la población en deciles de ingreso per cápita familiar del hogar y luego se la agrupó en tres niveles según el siguiente criterio: deciles 1 a 4: nivel bajo; deciles 5 a 8: nivel medio; deciles 9 y 10: nivel alto. El nivel bajo incluye a la población residente en hogares sin ingresos.

**Cuadro 6** Porcentaje de fumadores en la población mayor de 14 años según escala de ingreso del hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nivel de ingreso del hogar	% de fumadores
Bajo	19,4
Medio	22,6
Alto	24,5
<b>Total</b>	<b>21,7</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

Otro aspecto a partir del cual conviene caracterizar comparativamente a la población fumadora es el de acceso y demanda de servicios de salud.

Un primer señalamiento al respecto es que si bien no existen diferencias importantes entre fumadores y no fumadores en cuanto a la disponibilidad de **cobertura médica**, es de notar que la ausencia de cobertura en salud es ligeramente más marcada entre los fumadores que entre los no fumadores (22% y 19,3% son los porcentajes respectivos de población sin cobertura).

**Cuadro 7** Distribución porcentual de la población mayor de 14 años por cobertura del sistema de salud según condición de fumador. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Cobertura de salud	Fumadores	No fumadores
Sin cobertura	22	19,3
Con cobertura	78	80,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

En cuanto a los **plazos transcurridos desde la última consulta médica**, los datos indican que la proporción de fumadores que realizaron la última consulta al médico en un plazo *superior* a seis meses es más significativa que de la de no fumadores. Esta relación se mantiene aún si se analizan los resultados según sexo. La consideración de los resultados por sexo es necesaria si se tiene en cuenta que la demanda de atención médica varía de manera importante entre varones y mujeres (las mujeres tienden a consultar al médico más asiduamente que los varones) y que dentro de la población fumadora existen proporcionalmente menos mujeres que en la población no fumadora.

**Cuadro 8** Distribución porcentual de la población mayor de 14 años por plazo transcurrido desde la última consulta a un médico según sexo y condición de fumador. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Plazo transcurrido desde la última consulta al médico	Total		Varones		Mujeres	
	Fumadores	No fumadores	Fumadores	No fumadores	Fumadores	No fumadores
Hace seis meses o menos	62,2	70,4	52,2	62,6	71,9	76,4
Hace más de seis meses	35,9	27,9	45,1	34,9	27,1	22,6
No recuerda	1,7	1,5	2,5	2,2	1	0,9
Nunca consultó	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

Atendiendo a que fumar no sólo es perjudicial para la salud del propio fumador sino también para toda persona expuesta al humo ambiental de tabaco (“tabaquismo pasivo”), resulta relevante analizar la **convivencia de fumadores con no fumadores en el hogar** y, en particular, la exposición de niños al tabaco.

En primer lugar, la observación del **universo de hogares** de la Ciudad revela que la mayoría de ellos, 64,2%, está habitado netamente por no fumadores. Ahora bien, esta proporción disminuye ligeramente a 61,8% al considerar los hogares donde hay al menos un niño.

**Cuadro 9** Distribución porcentual de los hogares y de los hogares con menores (\*) por presencia de fumadores. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Presencia de fumadores en el hogar	Total de hogares	Hogares con menores
Sin fumadores	64,2	61,8
Con fumadores	35,8	38,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(\*) Hasta 10 años.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.

En cuanto a la **incidencia de fumadores pasivos en los hogares**, es de señalar que un 27,3% de la población que no fuma convive con fumadores. Ese porcentaje se eleva a 38,2% si enfocamos solamente a los menores de 10 años.

**Cuadro 10** Distribución porcentual de la población que no fuma y de la población de hasta 10 años por presencia o no de fumadores en el hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Hogares de la Ciudad	Población que no fuma (*)	Población de hasta 10 años
Sin fumadores	72,7	61,8
Con fumadores	27,3	38,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(\*) Incluye a los menores.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares 2006.