

## INDICADORES DE MORTALIDAD

INDICADOR	TBM			TMAPE		
Jurisdicción	TOTAL	VARONES	MUJERES	TOTAL	VARONES	MUJERES
<b>Total país</b>	<b>7,93</b>	<b>8,67</b>	<b>7,21</b>	<b>7,55</b>	<b>9,86</b>	<b>5,82</b>
<b>Región centro</b>	<b>8,91</b>	<b>9,64</b>	<b>8,21</b>	<b>7,51</b>	<b>9,95</b>	<b>5,73</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,74	11,85	11,64	6,55	8,81	5,11
Buenos Aires	8,47	9,34	7,64	7,76	10,20	5,92
Córdoba	8,28	9,05	7,54	7,44	9,83	5,71
Entre Ríos	8,11	9,03	7,20	7,87	10,60	5,84
Santa Fe	9,13	9,85	8,44	7,66	10,16	5,82
<b>Región Cuyo</b>	<b>6,95</b>	<b>7,77</b>	<b>6,15</b>	<b>7,48</b>	<b>9,47</b>	<b>5,88</b>
La Rioja	5,65	6,24	5,06	7,67	9,23	6,27
Mendoza	7,25	8,13	6,41	7,20	9,24	5,59
San Juan	7,00	7,63	6,39	8,06	9,81	6,64
San Luis	6,60	7,70	5,49	7,71	10,15	5,72
<b>Región Noroeste</b>	<b>5,78</b>	<b>6,44</b>	<b>5,11</b>	<b>7,54</b>	<b>9,22</b>	<b>6,09</b>
Catamarca	5,60	5,93	5,27	6,90	8,27	5,77
Jujuy	5,43	6,28	4,59	7,56	9,38	6,00
Salta	5,45	6,15	4,75	7,65	9,20	6,26
Santiago del Estero	5,44	5,93	4,87	7,03	8,42	5,70
Tucumán	6,46	7,19	5,74	7,88	9,88	6,29
<b>Región Noreste</b>	<b>5,96</b>	<b>6,86</b>	<b>5,05</b>	<b>8,26</b>	<b>10,34</b>	<b>6,47</b>
Corrientes	6,38	7,18	5,60	8,00	10,17	6,28
Chaco	6,31	7,30	5,31	8,85	11,16	6,88
Formosa	5,59	6,44	4,73	8,06	9,63	6,58
Misiones	5,38	6,31	4,42	8,04	10,04	6,22
<b>Reg. Patagónica</b>	<b>5,43</b>	<b>6,43</b>	<b>4,42</b>	<b>6,99</b>	<b>9,12</b>	<b>5,16</b>
Chubut	5,46	6,24	4,66	7,05	8,93	5,45
La Pampa	7,60	8,77	6,42	7,10	9,54	5,10
Neuquén	4,42	5,34	3,50	6,56	8,71	4,77
Río Negro	5,76	6,93	4,58	6,95	8,98	5,13
Santa Cruz	4,94	6,15	3,68	7,69	10,20	5,49
Tierra del Fuego	2,92	3,49	2,32	6,75	8,54	5,19

**TBM** - Tasa bruta de mortalidad (2003) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 47/04

**TMAPE** - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2003).

### Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2003)

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.